

راهنمای سایت RheumaPharmapp.ir



- 1 نصب اپلیکیشن بر پایه وب (web application)
- 2 جست و جو دارو ها به دو زبان فارسی و انگلیسی
- 3 دسته بندی فارماکولوژی دارو ها
- 4 متداول ترین و چالشی ترین سوالات مرتبط به داروهای روماتولوژی
- 5 نظرسنجی درباره محتوا و طراحی سایت و اپلیکیشن
- 6 معرفی کمیته علمی و اجرایی
- 7 ارتباط با گردانندگان سایت و امکان بازخورد در خصوص محتوای علمی
- 8 تم شب/تم روز

ابتدا باید ثبت نام و ورود کاربران از قسمت زیر صورت می گیرد.

ثبت نام

پنل کاربری

نام کاربری *

ایمیل *

رمز عبور *

تکرار رمز عبور *

نام *

نام خانوادگی *

تلفن همراه *

جنسیت *

مرد ☐

زن ☐

مدرک تحصیلی *

ثبت نام

ثبت نام

پنل کاربری

نام کاربری یا ایمیل *

رمز عبور *


ورود

☐ من را به خاطر داشته باش

فراموشی رمز عبور

بخش های مختلف سایت به شرح زیر می باشد:

1 برای نصب اپلیکیشن، گزینه ی مشخص شده را انتخاب و گزینه install را کلیک کنید. برای نصب اپلیکیشن در ویندوز و اندروید از تمام مرورگر ها به جز فایرفاکس می شود استفاده کرد. اپلیکیشن در گوشی های ios پشتیبانی نمی شود. در برخی مرورگر کروم گوشی های اندرویدی در انتهای صفحه shortcut نصب ظاهر می شود. هم چنین از طریق منوی مرورگر و گزینه install app قابلیت نصب دارد.



2 در قسمت جست و جو، نام داروها را فارسی یا انگلیسی می توانید جست و جو کنید و مونوگراف های دارویی را بررسی کنید.

Q cyclospo

Cyclosporine

نام دارو سیکلوسپورین (Cyclosporine) دسته دارویی و اشکال دارو دسته دارویی: مهارکننده کلسی نورین، تضعیف کننده سیستم ایمنی شکل دارویی: کپسول: ۵۰mg...

مونوگراف های دارویی را به کمک outline که در سمت راست صفحه وجود دارد به صورت سریع می توانید بررسی کنید (A). ساینز فونت (B) و تم (C) آن را تغییر بدهید، مونوگراف را به صورت pdf ذخیره کنید (D) و همچنین می توانید به تنظیمات پیش فرض بگردانید (E).

خانه دسته بندی سوالات متداول نظرسنجی درباره ما ارتباط با ما پنل کاربری

Rheuma Pharm

جستجو

نام دارو

سیکلوسپورین (Cyclosporine)

دسته دارویی و اشکال دارو

دسته دارویی:

مهارکننده کلسی نورین، تضعیف کننده سیستم ایمنی

شکل دارویی:

کپسول: ۲۵mg، ۵۰mg و ۱۰۰mg

محلول های خوراکی: دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در میلی لیتر

آمپول: ۵۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر یا ۲۵۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

اشکال دارویی تغییر یافته (aqueous dispersion) میکرومولسیون قابل جایگزینی با اشکال دارویی تغییر نیافته نیستند. این تغییرات در اشکال دارویی کپسول و محلول های خوراکی منجر به افزایش فراهمی زیستی دارو شده است. در میان سیکلوسپورین های موجود در بازار دارویی ایران، ساندیمون نورال و ایمنورال دارای فرمولاسیون تغییر یافته هستند و قابلیت جایگزینی با هم را دارا می باشند

دوز بندی و نکات تجویز دارو

- دارو با دوز ۲.۵mg/kg/day شروع می شود و معمولاً دوز روزانه در دو دوز منقسم تجویز می شود.

- حصول پاسخ درمانی معمولاً پس از سپری شدن حداقل ۸-۴ هفته از مصرف دارو رخ می دهد و پاسخ حداکثری طی ۱۲ هفته مشاهده می شود.

فهرست مطالب

۱. نام دارو

۲. دسته دارویی و اشکال دارو

۳. دوز بندی و نکات تجویز دارو

۴. تنظیم دوز دارو

۵. ارزیابی ها و اقدامات لازم پیش از شروع و حین مصرف

۶. موارد منع مصرف

۷. واکنش های حساسیت

۸. تداخلات دارویی قابل توجه

۹. بارداری/بارداری/ شیردهی

۱۰. عوارض جانبی دارو و مدیریت آن

۱۱. منابع


3 در این قسمت داروها را به صورت طبقه بندی شده در دسترس دارید و می توانید به مونوگراف ایشان دسترسی داشته باشید

— داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی
- سیکلو فسفامید - سیکلوسپورین - مایکوفنولات - آزاتیوپرین
+ داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده بیماری (DMARDs) سنتی
+ داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده بیماری (DMARDs) بیولوژیک
+ گلوکوکورتیکوئیدها
+ داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)
+ داروهای کاهنده سطح اورات و کلشی سین
+ دارودرمانی استئوپروز

4 بیست و شش سوال رایج دانشجویان و محققین در این قسمت گردآوری شده اند.

+ ۱. اکیناسه که در برخی از فرآورده های گیاهی و مکمل ها موجود است با توجه به خاصیت تقویت سیستم ایمنی ممکن است باعث کاهش اثر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی شود. اکیناسه در چه محصولات دارویی در ایران موجود است؟
+ ۲. گیاه St johns wort که در برخی مکمل ها و فرآورده های گیاهی موجود است با القای آنزیم های کبدی می تواند متابولیسم بسیاری از داروها را تغییر دهد و باعث ایجاد تداخل شود. St johns wort در چه محصولات دارویی در ایران موجود است؟
+ ۳. فرق دو داروی مایکوفنولات موفتیل (cellcept) و مایکوفنولات سدیم (myfortic) چیست؟
+ ۴. بیوپسی کبد در بیمارانی که MTX دریافت می کنند در چه شرایطی توصیه می شود؟
+ ۵. آیا انجام تست chest x ray پیش از تجویز MTX توصیه می شود؟
+ ۶. در بیماران مصرف کننده cDMARDs نوع پایش و زمان بندی انجام آن ها چگونه است؟
+ ۷. دو تست IGRA و TST که جهت تشخیص latent TB مورد استفاده قرار می گیرند چه تفاوتی از لحاظ sensitivity و specificity دارند؟
+ ۸. با توجه به تجویز واکسن BCG در ایران در بدو تولد، استفاده از TST جهت تشخیص TB کمک کننده خواهد بود؟
+ ۹. تفاوت دو داروی هیدروکسی کلروکین و کلروکین فسفات از لحاظ دوز تجویزی چگونه است؟

5 در این قسمت از کاربران درخواست می شود نظرسنجی طراحی شده را تکمیل نمایند و ما را در ارزیابی این نرم افزار یاری کنند.



رتبه بندی کیفیت برنامه

این پرسشنامه جهت بررسی نظرات کاربران محترم اپلیکیشن RheumaPharm برای ارزیابی محورهای مختلف کیفی این اپلیکیشن طراحی شده است. مشارکت شما در این مطالعه به منزله رضایت شما جهت چاپ انجام آنالیز روی داده ها خواهد بود و کلیه اطلاعات شما محرمانه باقی خواهد ماند.

تکمیل این پرسشنامه 15 دقیقه زمان خواهد برد. پیشاپیش از این که وقت می گذارید و ما را در پیشبرد این هدف بزرگ یاری مینمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

6 معرفی کمیته علمی و اجرایی در این قسمت صورت می گیرد

7 در این قسمت کاربران پیشنهادات، انتقادات و مشکلات سایت را ذکر می کنند

نام
نام خانوادگی
ایمیل
موضوع
پیام
ارسال